

Pommier

Mise à fruit d'une coursonne

▼ Première année

Taillez le rameau à bois sur 3 yeux bien formés.




◀ Troisième année

L'œil de couverture redonne un rameau à bois, le dard s'est transformé en bouton à fleur et l'œil latent en dard. La mise à fruit étant assurée, ne conservez plus de zone de couverture. Taillez au-dessus du bouton à fleur. Le dard de la base doit normalement se transformer en bouton à fleur.




▼ Deuxième année

L'œil d'extrémité donne un rameau à bois, le deuxième un dard et celui de la base reste à l'état latent. C'est une bonne évolution vers la mise à fruit, mais conservez une zone de couverture au-dessus du dard car, s'il recevait trop de sève, il se transformerait en rameau. Taillez le rameau à bois sur le premier œil bien formé. Le rameau issu de cet œil servira de tire-sève et permettra au dard de se transformer en bouton à fleur et à l'œil latent de la base d'évoluer en dard.




▲ Quatrième année

Le bouton à fleur produit des fruits. Après la récolte, en fin d'été, une bourse apparaît. Le dard de la base s'est transformé en bouton à fleur. Taillez au-dessus de celui-ci pour rapprocher la fructification de la branche charpentière.



▲ Année suivante

La bourse apparue après la récolte porte des éléments fertiles soit 1 ou 2 dards, soit un bouton à fleur et un dard, soit une brindille et un dard. La fructification est donc installée pour plusieurs années.



Durant les premières années, la taille de fructification consiste à «éduquer» la coursonne pour provoquer sa mise à fruit. Le principe présenté ici est idéal. Il convient de l'adapter en fonction de la vigueur de l'arbre, de ses réactions, de la végétation qu'il a développée l'année précédente.

● Les coursonnes très faibles, qui reçoivent peu de sève brute, restent latentes ou ne se développent pas complètement. Vous devez effectuer une taille plus courte.

● Les coursonnes trop vigoureuses ne peuvent être maîtrisées par une taille à 3 yeux. Il faut tailler plus long.

La taille des années suivantes a pour objectif de renforcer et de renouveler la fructification pour obtenir des fruits de calibre suffisant.

Là encore, il faut adapter l'intervention à la vigueur de la coursonne.